

★ ★ ★ ★ ★

Institut Préparatoire aux Etudes
D'ingénieurs de Sfax

Devoir de Synthèse d'Algèbre N°1

NB : L'usage de la calculatrice est strictement interdit.

Section : MP1

Durée : 02 Heures

N. de pages : 02

Exercice 1

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

On rappelle que A est nilpotente, s'il existe un entier naturel non nul p tel que $A^p = (0)$ et $\text{tr}(A) = a + d$.

(1) Calculer $A^2 - \text{tr}(A) \cdot A + \det(A) \cdot I_2$.

(2) On suppose dans cette question que A est nilpotente.

(a) Montrer que $\det(A) = 0$.

(b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $A^k = \alpha A$.

(c) Montrer que $\text{tr}(A) = 0$ et que $A^2 = (0)$.

Exercice 2

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ et $|a| \neq 1$.

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{pmatrix}$ et $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) (a) Vérifier que A est antisymétrique.

(b) En déduire que A est non inversible.

(2) On pose $A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 - a^2 \\ b & -c & -ab \\ c & b & -ac \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que $P \in GL_3(\mathbb{R})$.

(b) Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $A'^3 = \alpha A'$.

On admet, dans la suite, que $A = PA'P^{-1}$.

- (3) Vérifier que $A^3 = -A$.
- (4) Soient $k \in \mathbb{R}^*$ et $B_k = k.I_3 + A$.
 - (a) Vérifier que $B_k = P(k.I_3 + A')P^{-1}$.
 - (b) Montrer que B_k est inversible.
 - (c) En déduire que $B'_k = k.I_3 - A$ est inversible.
 - (d) Montrer que $B_k^{-1} = \frac{1}{k}.I_3 - \frac{1}{k^2 + 1}.A + \frac{1}{k(k^2 + 1)}.A^2$

Exercice 3

Soient $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et $\mathbb{U}_n = \{z_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}; k \in \mathbb{Z}\}$.

- (1) Montrer que $\mathbb{U}_n = \{z_r = e^{\frac{2ir\pi}{n}}; r \in \{0, \dots, n-1\}\}$.
- (2) En déduire que si $\mathbb{U}_n = \mathbb{U}_m$, alors $n = m$.
- (3) Montrer qu'il existe $w \in \mathbb{U}_n$ tel que $\forall z \in \mathbb{U}_n, \exists k \in \mathbb{Z}$ vérifiant $z = w^k$.

On dit que w est un générateur de $\mathbb{U}_n$.

- (4) (a) Montrer que $z_m = e^{\frac{2im\pi}{n}}$ est un générateur de $\mathbb{U}_n$ si et seulement si m et n sont premiers entre eux.
- (b) Montrer que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m$ si et seulement si n/m .
- (c) En déduire que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_{n \wedge m}$.
- (d) On suppose dans cette question que m et n sont premiers entre eux.

Déterminer $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$.

- (5) On définit sur $\mathbb{U}_n$ une loi de composition interne notée $(*)$ définie par :

$$z_k * z_{k'} = z_{kk'}, \quad \text{où } (k, k') \in \mathbb{Z}^2$$

On rappelle que $z_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.

- (a) Montrer que la loi $(*)$ est commutative, associative et admet un élément neutre $e \in \mathbb{U}_n$.
- (b) On suppose dans cette question que $n = 4$.

Déterminer les éléments symétrisables de $\mathbb{U}_4$ pour la loi $(*)$.

- (c) On suppose dans cette question que m et n sont premiers entre eux.

Montrer que z_m est symétrisable dans $\mathbb{U}_n$ pour la loi $(*)$.